

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 23-5-79106888

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone : 86-36-24

Commission Paritaire de Presse n° 530 AD

ABONNEMENT ANNUEL : 60 F

M. le Sous-Régisseur de recettes  
de la Protection des Végétaux

93, rue de Curambourg - B.P. 210  
45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX  
C. C. P. : La Source 4604-25 C

BULLETIN TECHNIQUE N° 247

22 MAI 1979

### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

### /ARBRES FRUITIERS/

Dans certaines régions notamment celle de Saint Martin d'Auxigny (18), les récentes précipitations ont conduit à un lessivage assez rapide de la couverture fongicide. Par ailleurs, la végétation continue de croître rapidement et les projections d'ascospores se poursuivent. Des taches de tavelures résultant des contaminations de fin Avril à début Mai continuent d'apparaître dans les vergers insuffisamment protégés. Il est donc nécessaire, si ce n'est déjà fait, de prévoir une nouvelle application.

### OIDIUM DU POMMIER

Il convient pour les variétés sensibles d'ajouter à la bouillie destinée à combattre la tavelure un produit actif contre l'oïdium.

### CYLINDROSPORIOSE (ANTHRACNOSE) DU CERISIER

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à cette maladie. Il est donc conseillé d'intervenir en utilisant l'un des fongicides suivants (doses exprimées en grammes de matière active par hectolitre) : BENOMYL (Benlate) : 30 - DITHIANON (Delan) : 50 - DOGUADINE (Dodinal ou Melprex) : 80 - FOLPEL (Nombreuses spécialités) : 100 - MANEBE (Nombreuses spécialités) : 160 - OXYQUINOLEATE DE CUIVRE (Quinolate 400) : 50 (à ne pas utiliser en pépinière) - THIOPHANATE METHYL (Pelt 44) : 70.

### PUCERONS - CHENILLES - PSYLLES

L'activité de ces ravageurs est actuellement très limitée. Néanmoins, la surveillance des vergers doit se poursuivre.

### ARAIGNEES ROUGES

L'éclosion des oeufs d'hiver est maintenant bien avancée dans la plupart des vergers. Une intervention avec un acaricide spécifique ne doit être réalisée que si les populations larvaires la justifient. En conséquence, il est nécessaire d'effectuer des observations.

### DORYPHORE

### / POMMES DE TERRE /

Les adultes et les premières pontes viennent d'être observés mais il est encore trop tôt pour intervenir.

### CRIOCERES DE L'ASPERGE

### / CULTURES LEGUMIERES /

Des adultes et des pontes sont actuellement observés dans certaines plantations. Il est donc nécessaire de surveiller les cultures afin d'intervenir, le cas échéant, lorsqu'apparaîtront les premiers dégâts ou les premières larves. Il conviendra d'utiliser l'un des insecticides suivants :

- Soit en pulvérisation : LINDANE (20 g/hl) - PARATHIONS (30 g/hl) -
- Soit en poudrage : LINDANE (350 g/ha) - PARATHIONS (350 g/ha) -

/Ingénieur en Chef d'Agronomie,

Chef de la Circonscription Phytosanitaire "CENTRE",  
G. BENAS